



AVOINE BRODIFACOUUM

FICHE TECHNIQUE

**GAMME
PRO.**


DESCRIPTIF PRODUIT

Matière active : **Brodifacoum 0,005 %**

Contient un agent amérisant (0,001%)

A.M.M FR-2016-0034 - «FANGA RONGEUR PRO»

Support :	Céréales (avoine décortiquée)
Couleur :	bleu
Cibles	Rats, souris
Usages autorisés :	Professionnels 3D certifiés
Lieu d'utilisation :	interieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles aux abords des infrastructures, dans les déchetteries et décharges
Réf. RA858 :	Sac de 20 Kg (vrac)

INFORMATIONS COMMERCIALES

Appât prêt à l'emploi pour un usage polyvalent contre les rats et souris. Très bonne appétence en milieux secs.

Appât à base de Brodifacouum :

- Efficace par ingestion unique.
- Antidote disponible (vitamine K1 sous contrôle médical).

Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume (Benzoate de Denatonium) prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.

Les rongeurs meurent quelques jours après consommation, ce qui n'éveille donc pas la méfiance de leurs congénères.

Les rongeurs consomment peu de nourriture sur le même poste, aussi faut-il les multiplier pour accroître les chances de succès.

MÉTHODE D'APPLICATION

Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appât sécurisées étiquetées ou dans d'autres stations d'appâts couvertes assurant le même niveau de protection. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles.

Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l'espèce ciblé. Si possible, éliminer toute source de compétition alimentaire sur le site. Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux (risques d'intoxication secondaire).

Doses d'utilisation :

Contre les rats : 180 à 200g tous les 5 à 10 mètres : contre les souris : 25 à 60 g tous les mètres tous les 1 à 2 mètres.

Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés.

TOXICOLOGIE

Non classé

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur 1
Mise à jour le 31.05.16

FDS disponible sur www.aedes.fr